

IMPFKALENDER

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), 2012.
www.stiko.de

Die Impfungen sollten zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen.
Die Überprüfung des Impfstatus ist in jedem Lebensalter sinnvoll.
Fehlende Impfungen sollten sofort, entsprechend den Empfehlungen
für das jeweilige Lebensalter, nachgeholt werden.




| ALTER \ IMPFUNG | Säuglinge (in Monaten) | | | Kleinkinder | | Kinder (in Jahren) | | | Jugendliche | Erwachsene | | |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------|----|-----------------------|----------------|--------------------|-------|-------|------------------------------|------------|-----------------|-------|
| | 2 | 3 | 4 | 11 – 14 | 15 – 23 | 2 – 4 | 5 – 6 | 7 – 8 | 9 – 11 | 12 – 17 | ab 18 | ab 60 |
| | U4 | | U6 | | U7 | U7A/8 | U9 | J1 | | | | |
| Tetanus | G1 | G2 | G3 | G4 | N | A1 | N | A2 | A (alle 10 Jahre, ggf. N) | | | |
| Diphtherie | G1 | G2 | G3 | G4 | N | A1 | N | A2 | A (alle 10 Jahre, ggf. N) | | | |
| Keuchhusten Pertussis | G1 | G2 | G3 | G4 | N | A1 | N | A2 | A (ggf. N) ^e | | | |
| Kinderlähmung Poliomyelitis | G1 | G2 ^a | G3 | G4 | N | | | A1 | ggf. N | | | |
| Hepatitis B | G1 | G2 ^a | G3 | G4 | N | | | | | | | |
| Hib Haemophilus influenzae Typ b | G1 | G2 ^a | G3 | G4 | N ^f | | | | | | | |
| Pneumokokken | G1 | G2 | G3 | G4 | N ^f | | | | | | S ^b | |
| Meningokokken Serogruppe C | | | | G1 (ab 12 Monaten) | | N | | | | | | |
| Masern Mumps Röteln | | | | G1 | G2 | N | | | | | S ^c | |
| Windpocken Varizellen | | | | G1 | G2 | N | | | | | | |
| Grippe Influenza | | | | | | | | | | | S (jährlich) | |
| HPV Humanes Papillomvirus | | | | | | | | | G1 – G3 ^d | | | |

Nächste Impftermine

ERLÄUTERUNGEN

- G** GRUNDIMMUNISIERUNG (in bis zu 4 Teilimpfungen G1–G4)
- S** STANDARDIMPFUNG
- A** AUFFRISCHIMPFUNG
- N** NACHHOLIMPFUNG (Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)
- U** Früherkennungsuntersuchung
- J** Jugenduntersuchung (J1 im Alter von 12–14 Jahren)

- a** Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen.
- b** Einmalige Impfung, Auffrischimpfung nur für bestimmte Indikationen empfohlen.
- c** Einmalige Impfung gegen Masern für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit. Vorzugsweise mit einem MMR-Impfstoff.
- d** Standardimpfung für Mädchen und junge Frauen.
- e** Einmalige Auffrischimpfung, möglichst mit der nächsten Impfung gegen Tetanus/Diphtherie/ggf. Poliomyelitis.
- f** Die Anzahl der erforderlichen Impfungen ist altersabhängig.



Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages